

日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)

<h3>Quick Guide</h3>   <p>To view the user guide, scan the QR code.</p>	<p>1 Ważne Przebieg leczenia może być różny dla różnych osób. Ten plik służy jako przewodnik i nie należy go traktować jako porady lekarskiej. Jeśli masz jakikolwiek pytania, skonsultuj się z lekarzem.</p> <p>2 Opis produktu Proszek do inhalacji zawiera 120 mg kofeiny i 6 mg salicylicznej soli kwasu acetylosalicylowego w postaci cząstek o rozmiarze 1-5 μm.</p> <p>3 Składniki W składniki czynne wchodzi kofeina i kwas acetylosalicylowy.</p> <p>4 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>5 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>6 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>7 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>8 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>9 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>10 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>11 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>12 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>13 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>14 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>15 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>16 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>17 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>18 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>19 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>20 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>21 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>22 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>23 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>24 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>25 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>26 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>27 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>28 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>29 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>30 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

封面

封底

<p>31 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>32 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>33 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>34 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>35 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>36 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>37 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>38 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>39 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>40 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>41 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>42 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>43 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>44 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>45 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>46 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>47 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>48 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>49 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>50 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>51 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>52 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>53 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>54 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>55 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>56 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>57 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>	<p>58 Przebieg leczenia Proszek do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.</p> <p>59 Przeciwwskazania Nie należy stosować proszku do inhalacji, jeśli jesteś uczulony na kofeinę lub kwas acetylosalicylowy.</p> <p>60 Ważne informacje Należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do proszku do inhalacji.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技术规格:

- 1、材质：128g哑粉过哑油。
- 2、尺寸：70X140mm,公差±1mm。
- 3、印刷：单黑印刷。
- 4、折页来货。

适用于EU、UK版本

		物料代码 (P/N)	612804000674
		物料名称 (Name)	入门指南(欧版)
设计 (Designer) / 日期 (Date)	杨茹萍 / 2024.09.10	项目 (Project)	Dodge
电话 (Tel)	17722661061	版本 (Version)	V12.1
邮箱 (Email)		状态 (Status)	
审核 (Check) / 日期 (Date)		页码 (Page)	第 1 页, 共 1 页
批准 (Approval) / 日期 (Date)		受控文件	